Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général HGGSP + HLP, veuillez visiter :
bac-hggsp-hlp.fr/annales-sujets-et-corriges

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE ANTICIPÉE

Pour les candidats AVEC ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.

Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.

Répartition des points


Première partie	6 points
Deuxième partie	14 points

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 points)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Soient A et B deux événements.
On donne l'arbre de probabilités ci-contre :



On peut alors affirmer que $\mathrm{P}(\bar{A} \cap B)$ est égale à :

a. 1,3	**b.** 0,42	**c.** 0,7	**d.** 0,18

Question 2

Dans un lycée, 150 élèves de première générale suivent la spécialité Mathématiques ce qui représente $\frac{3}{5}$ de l'ensemble des élèves de première générale.

Le nombre d'élèves en première générale dans ce lycée est :

a. 90	**b.** 200	**c.** 250	**d.** 300

Question 3

On considère les nombres $A = \frac{1}{3}$ et $B = \frac{5}{6}$.


Le nombre $\frac{A}{B} + 1$ est égal à :

a. $\frac{7}{5}$	**b.** $\frac{3}{5}$	**c.** $\frac{23}{18}$	**d.** $\frac{7}{3}$


Question 4

Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, la droite d d'équation réduite $y=\frac{1}{3}x+1$ est représentée par :


a.




b.



c.



d.



Question 5

La forme développée de $(x^3-1)^2$ est :

a.	x^6-1	**b.**	x^6-2x^3+1
c.	x^5-2x^3+1	**d.**	x^6+2x^3-1

Question 6

L'évolution globale correspondant à une hausse de 20 % puis une baisse de 50 %, est une baisse de :

a. 10 %	**b.** 30 %	**c.** 40 %	**d.** 60 %

Question 7

Ce tableau donne les résultats partiels d'un sondage dans une classe de première comptant 25 élèves :

	16 ans ou moins	**Plus de 16 ans**
Suivent la spécialité Mathématiques	8	
Ne suivent pas la spécialité Mathématiques	7	4

On interroge un élève de cette classe au hasard.
La probabilité que ce soit un élève qui suive la spécialité Mathématiques sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans est :

a. $\frac{3}{7}$	**b.** $\frac{6}{25}$	**c.** 6	**d.** $\frac{3}{5}$

Question 8

Soient x et y deux réels strictement positifs tels que : $x = \frac{5}{2+y}$

On peut affirmer que :

a. $y = \frac{10}{2x-5}$	**b.** $y = \frac{5}{2+x}$	**c.** $y = 5 - 2x$	**d.** $y = \frac{5}{x} - 2$

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

<u>Exercice 1</u> (5 points)

Un maire souhaite végétaliser sa ville. Pour cela, il décide de planter des mûriers platanes dans les différents parcs.
Ces arbres sont réputés pour leurs qualités d'ombrage et de résistance à la sécheresse.

Partie A

Au moment de la plantation, un mûrier platane mesure 1 mètre.
On suppose que chaque année la hauteur de l'arbre augmente de 40 cm.
Pour tout entier naturel n, on note u_n la hauteur de l'arbre, en mètres, n années après sa plantation. Ainsi $u_0 = 1$.


1) **a.** Calculer u_1.
b. Quelle sera la hauteur de l'arbre deux années après sa plantation ?
2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
3) Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.
4) Au bout de combien d'années le mûrier atteindra-t-il 9 mètres de haut ?

TOURNER LA PAGE

Partie B

Au moment de la plantation, l'arbre possède un tronc et deux branches.
Un an après la plantation, on observe 4 nouvelles branches.
Deux ans après la plantation, on observe 8 nouvelles branches.

Chaque année, le nombre de nouvelles branches double comme représenté sur le schéma ci-dessous :



Pour tout entier naturel n, on note v_n le nombre de nouvelles branches n années après la plantation. À la plantation, l'arbre possède 2 branches, ainsi on pose $v_0 = 2$.

1) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier.

2) **a.** Un an après la plantation, l'arbre a produit 4 nouvelles branches. Il possède alors un nombre total de branches égal à 6.

Montrer que, trois ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de branches égal à 30.

b. On donne le programme ci-contre écrit en langage Python :

```
v = 2
total = 2
for i in range(10):
    v = 2 * v
    total = total + v
print(total)
```

Rappel : `for i in range(n)` *permet de répéter* `n` *fois un ensemble d'instructions.*

La valeur affichée par ce programme est 4 094.
Dans le contexte de l'exercice, que représente la valeur 4 094 affichée par ce programme ?

Exercice 2 (3 points)

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé.
On considère les points $A(-1;5)$, $B(3;5)$ et $C(4;0)$.

1) **a.** Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b. En déduire la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

2) **a.** Montrer que $AC = 5\sqrt{2}$.

On admet que $AB = 4$.

b. Écrire l'expression permettant de calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en fonction de l'angle $\widehat{BAC}$.

c. En déduire une mesure, en radian, de l'angle $\widehat{BAC}$.

Aide aux calculs :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


TOURNER LA PAGE

Exercice 3 **(6 points)**

Soit f une fonction définie sur $]0; +\infty[$.

On a tracé dans le repère ci-dessous la courbe C_f représentative de la fonction f et la droite T_A tangente à la courbe C_f au point A de coordonnées $(1\,;20)$.

La droite T_A passe par le point B de coordonnées $(3\,;10)$.



1) a. Donner $f(1)$.

b. Déterminer la valeur de $f'(1)$.

c. Justifier que l'équation réduite de la tangente T_A à C_f au point A est :

$$y = -5x + 25.$$

Pour la suite de l'exercice, la fonction f est définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{4x^2+7x+9}{x}$.

On admet que f est dérivable sur cet intervalle.

2) a. Démontrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a $f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$.

b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

c. En déduire les variations de la fonction f sur $]0; +\infty[$.

3) Existe-t-il une tangente à C_f parallèle à la droite d'équation $y = 3x + 5$? Justifier votre réponse.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.